

B日程

- 1 (1) (ア) 4 (イ) 6 (ウ) d (エ) c (オ) 2 (1)各2点
(カ) 7 (キ) 1 (2)3点
(2) 断層 (3) 4 (3)2点
(4) やわらかい地盤ではゆれが大きく、かたい地盤ではゆれは小さくなるから。 (4)2点
(5) (ア) A (イ) 4秒 (5)各2点
- 2 (1) C (2) E (3) イ 各3点
(4) (ア) 2.8 (イ) かわらない (4)アは3点
イは4点
- 3 (1) 食塩 (2) ミヨウバン
(3) 食塩・・・約76g ミヨウバン・・・約50g ホウ酸・・・約30g
(4) 食塩・・・約2g ミヨウバン・・・約57g ホウ酸・・・約23g
(5) 再結晶 各3点
- 4 (1) (ア)a スライドガラス b カバーガラス c プレパラート
(イ) B、C (ウ) A→C→B→D
(2) (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 1 (エ) 3 (オ) d
(3) (ア) 1 (ウ) 3
(4) (A) 緑 (B) 黄
(5) ビーカーAのオオカナダモ 葉は紫色に染まった。
ビーカーBのオオカナダモ 葉の色は変化しなかった。 各2点